



Elvita Bor

PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY
Nieorganiczny nawóz mikroelementowy PFC 1(C)(II)(a)

A large, olive-green diamond shape is centered at the bottom of the page. Inside this diamond, the number '201' is written in a large, white, bold, sans-serif font. The diamond is surrounded by four intersecting lines that form a larger diamond shape, similar to the one at the top of the page.

201

Elvita Bor

PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY
Nieorganiczny nawóz mikroelementowy PFC 1(C)(II)(a)

Typologia: Nawóz mikroelementowy w postaci roztworu

SKŁAD (% w/w):

bor (B) w postaci boroetanolaminy, rozpuszczalnego w wodzie	11%
---	-----

SKŁADNIKI:

boretanolamina¹ (CAS 26038-87-9)

¹ Pierwotne surowce i mieszanki

Uprawa	Termin zabiegu	Dawka [l/ha]	Ilość cieczy roboczej [l/ha]
jabłoni, grusza	W fazie różowego pąka i w trakcie opadania płatków kwiatowych. Po zbiorach, ale przed żółknięciem liści	0,8-1,5	500-800
wiśnia, czereśnia, śliwa	W fazie białego pąka. Po zbiorach owoców przed rozpoczęciem żółknięcia liści	0,8-1,5	500-800
truskawki, maliny	Pierwszy zabieg w fazie białego pąka, drugi po 10-14 dniach	0,5-1,0	500-800
porzeczki, agrest	Po wytworzeniu pąków kwiatowych i pod koniec kwitnienia Przy silnym braku – po zbiorze, a przed opadnięciem liści	0,8-1,5 0,8-1,5	500-800 500-800
winogrono	Przed kwitnieniem i po kwitnieniu w momencie pojawienia się związków	0,8-1,5	500-800
warzywa kapustne	1-3 zabiegi, 2 tygodnie po wsadzeniu rozsady, następnie co 10-14 dni	0,8-1,5	400-600
pozostałe warzywa	1-3 zabiegi, na dobrze rozwinięte liście co 10-14 dni	0,8-1,5	400-600
rzepak	Jesienią: po wytworzeniu 6-8 liści Wiosną: po ruszeniu vegetacji, 10-14 dni później, po wytworzeniu pąków kwiatowych	0,6-1,0 0,6-1,0	200-300 200-300
buraki cukrowe	W fazie 6-8 liści oraz 10-14 dni później	0,6-1,0	200-300
ziemniaki	Przed zwraciem międzyrzędzi	0,4-0,8	200-300
rośliny motylkowe	W fazie 6-8 liści przed kwitnieniem	0,6-1,0	200-300
drzewa i krzewy ozdobne	W trakcie vegetacji z pominięciem okresu kwitnienia oraz przy silnych niedoborach	0,8-1,5	200-500
kwiaty	Przed kwitnieniem lub przy niedoborach	0,5-0,8	400-600

INSTRUKCJA UŻYCIA:

- napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wlewać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień pobierał go na bieżąco.

Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w czasie pochmurnej pogody.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: -10°C ÷ 30°C

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA: nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE: Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W pracach z nawozem używać rękawic ochronnych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zanieczyszczoną skórę lub oczy wypłukać bieżącą wodą. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W przypadku rozlania zebrać z materiałem pochłaniającym cieczę, następnie zanieczyszczone miejsce zmyć wodą. Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Data produkcji/nr serii

