

JEDNO CIĘCIE NA MIOTŁĘ
I CHWASTY DWULIŚCIENNE!



LANCET PLUS™



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

LANCET PLUS 125 WG

to rekomendacja dla rolników poszukujących wygodnego, gotowego rozwiązania problemu chwastów oraz wymagających bardzo wysokiej skuteczności chwastobójczej przy elastycznym terminie stosowania, **aż do fazy pierwszego kolanka zbóż.**



JEDNO CIĘCIE NA MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE!

Lancet Plus 125 WG to nowoczesny, kompletny herbicyd służący do powschodowego, wiosennego zwalczania **miotły zbożowej** i **chwastów dwuliściennych** w:

- pszenicy ozimej
- pszenżycie ozimym
- życie

JEDNA
SKUTECZNA
DAWKA

MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA
DO FAZY PIERWSZEGO
KOLANKA ZBÓŻ

LANCET PLUS™

Jedno cięcie!

CHWASTY. PRAKTYCZNY ATLAS

Najwyższa skuteczność i wygoda w zwalczaniu **(jedna dawka gotowego produktu)** najważniejszych chwastów takich jak miotła zbożowa, przytulia czepna, chwasty rumianowate, chaber bławatek, mak polny, ostrożeń polny, rdesty (powojowy, plamisty), gwiazdnica pospolita, komosa biała, fiołek polny, samosiewy rzepaku, przetaczniki i inne (tab. 1).



MIOTŁA
ZBOŻOWA

LANCET PLUS™



PRZYTULIA
CZEPNA



CHWASTY
RUMIANOWATE



FIOŁEK POLNY



CHABER
BŁAWATEK



MAK POLNY



OSTROŻEŃ
POLNY

OBJAWY DZIAŁANIA NA CHWASTACH

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybkie. Zahamowanie wzrostu chwastów wrażliwych następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach, w pierwszej kolejności na chwastach dwuliściennych, a następnie na miotle zbożowej.

Po wykonaniu zabiegu opryskiwania na chwasty możemy zaobserwować:

- zahamowanie wzrostu
- chlorozy (żółknięcie) i nekrozy
- deformacje i zamieranie zaczynające się od wierzchołków rośliny

W warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a miotły zbożowej może trwać nawet do 6-9 tygodni.



DAWKA I TERMIN ZABIEGU. JEDNO CIĘCIE!

JEDNA DAWKA


Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto – dawka: 200 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha
Zalecany z nowoczesnym adiuwantem – Dassoil™, który:

- ma doskonałe właściwości antypieniące cieczy roboczej w porównaniu do innych adiuwantów
- posiada wysoką zawartość substancji aktywnej >99%
- umożliwia użycie wody o każdej twardości
- jest łatwy do stosowania w szerokim zakresie temperatur wody od 3°C do 25°C

**LANCET
PLUS**
200 g/ha



+



DASSOIL™
0,5 l/ha


=

**IDEALNE
POŁĄCZENIE**

PRZEWAGA

Lancet Plus 125 WG stosujemy w pszenicy ozimej, pszenicy ozimym i życie.

Optymalny termin zabiegu to wiosna, po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia aż do fazy pierwszego kolanka zbóż.



Rys. 1. Stosowanie: dawka i termin aplikacji

Lancet Plus 125 WG
200 g/ha + Dassoil™
0,5 l/ha.

Możliwość stosowania
od fazy początku
krzewienia aż do fazy
pierwszego kolanka zbóż.

BEZPIECZEŃSTWO

Podwójna dawka (przypadkowe nałożenie preparatu) zastosowana w optymalnych warunkach pogodowych do fazy pierwszego kolanka zbóż nie powodowała w doświadczeniach rejestracyjnych uszkodzeń i nie wpływała ujemnie na wysokość i jakość plonu.

TEMPERATURA. ELASTYCZNOŚĆ

Produkt wnika do roślin w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na jego działanie.



Rys. 2. Minimalna temperatura działania

Zwalcza chwasty
już od 5°C, taka
minimalna temperatura
średniodobowa powinna
utrzymywać się przez
6 kolejnych dni po
zabiegu.



NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zastosowaniu herbicydu wiosną i po zbiorze plonu MOŻESZ zasiać/zasadzić:

- jesienią: **zboża, rzepak ozimy**, gorczycę na poplon, kapustę z rozsady, trawy
- wiosną: **zboża jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki**, sorgo, rzepak jary, gorczycę, słonecznik, cebulę z siewu, marchew, sałatę z rozsady, kapustę, kalafior, brokuł i inne rośliny kapustne, trawy.

Słomę ze zbóż opryskanych produktem MOŻESZ użyć jako paszę oraz ściótkę dla zwierząt lub pozostawić na polu i przyorać.

Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być użyta do ściótkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym pieczarek), warzyw: pomidora, papryki, roślin dyniowatych, sałaty i innych.

Obornik ze zbóż opryskanych herbicydem MOŻESZ wywieźć tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych (należy go wywieźć i bezpośrednio po tym wymieszać z glebą).

Jeśli stosujesz obornik pod buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, słonecznik, pomidory, paprykę, ogórki i rośliny dyniowate, sałatę, tytoń, marchew, pietruszkę lub inne warzywa, wywieź go i wymieszaj z glebą minimum 6 miesięcy przed ich uprawą.

W sprawie następstwa roślin dla innych upraw należy zapoznać się ze szczegółowym opisem na etykiecie-instrukcji stosowania lub skontaktować się z przedstawicielem Dow AgroSciences Polska.

DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA

Lancet Plus 125 WG zawiera piroksysulam, substancję czynną z grupy triazolopirymidyn o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu enzymu ALS/AHAS (wg HRAC grupa B) wobec miotły zbożowej.

Została udokumentowana odporność miotły zbożowej na substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS, w tym z grupy pochodnych sulfonilomocznika. Stosowanie herbicydów o tym samym mechanizmie działania ale należących do odmiennych grup chemicznych, może prowadzić do wyselekcjonowania form odpornych na zasadzie odporności krzyżowej.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej na substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS, zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą należy:

- ograniczyć stosowanie herbicydów o mechanizmie działania ALS/AHAS do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym
- stosować środki o mechanizmie działania ALS/AHAS na tym polu przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania
- ściśle przestrzegać zaleceń umieszczonych na etykiecie stosowania środka, w tym nie stosować dawek niższych od zalecanych
- jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występują chwasty odporne na herbicydy o mechanizmie działania ALS/AHAS, nie należy stosować na tym polu herbicydu o ww. mechanizmie działania na te chwasty w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub z producentem środka ochrony roślin.

DOSKONAŁY WYBÓR TAKŻE DLA WYMAGAJĄCEGO SĄSIADA

- wygodne i kompletne rozwiązanie na miotłę i wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne
- możliwość stosowania do fazy pierwszego kolanka zbóż
- jedna skuteczna dawka
- tysiące zadowolonych klientów

**DZIAŁA
JUŻ OD 5°C**

**ODPORNÓŚĆ
NA ZMYWANIE
1 h**

**PRAKTYCZNE
OPAKOWANIA
W ZALEŻNOŚCI
OD POTRZEB**



TABELA CHWASTÓW

Tab. 1. Zakres zwalczanych chwastów oraz stopień skuteczności uzyskiwany w doświadczeniach w Polsce i w Europie

CHWASTY	LANCET PLUS 125 WG 200 g/ha + ADIUWANT
Miotła zbożowa	+++
Przytulia czepna	+++
Rumian polny	+++
Rumianek pospolity	+++
Chaber bławatek	+++
Fiołek polny przed kwitnieniem	+++
Fiołek polny w fazie kwitnienia	++(+)
Mak polny	+++
Maruna bezwonna	+++
Ostrożeń polny po wschodach w fazie rozety liści	+++
Komosa biała w fazie do 4-6 liści	+++
Samosiewy rzepaku - rozeta liści	+++
Samosiewy rzepaku - strzelanie w pędy	++(+)
Rdest plamisty	+++
Rdest powojowy	+++
Psianka czarna	+++
Gwiazdnica pospolita	+++
Tasznik pospolity	+++
Tobołki polne	+++
Gorczyca polna	+++
Wyka wąskolistna	+++
Mlecz polny	++
Milek letni	+++
Niezapominajka polna	+++
Stulicha psia	+++
Jasnota purpurowa	++
Jasnota różowa	+++
Poziewnik szorstki < 4 liści	+++
Przetacznik polny	+++
Przetacznik perski	+++
Przetacznik bluszczykowy	++
Rzodkiew świrzepa	+++
Owies głuchy	++(+)
Dymnica pospolita	++

Skuteczność: +++ bardzo dobra, ++(+) dobra plus, ++ dobra

Edycja: Rok 2016

®™ znak towarowy firmy The Dow Chemical Company („Dow”) lub spółki stowarzyszonej z Dow

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

APLIKACJA MOBILNA



Dow AgroSciences

Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
tel. 22 548 73 00, fax 22 548 73 09
e-mail: fwrpols@dow.com
internet: www.dowagro.pl

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.