

UNIWERSALNY HERBICYD WIOSENNY DO ZWALCZANIA CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH W ZBOŻACH

Doskonały w technologii podstawowej oraz na zabiegi poprawkowe

MUSTANG  **FORTE** TM
Król złotych pól



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE W TECHNOLOGII PODSTAWOWEJ ORAZ DAWCE OBNIŻONEJ NA ZABIEGI POPRAWKOWE

RECEPTA

Teraz sity Mustanga
w mniejszej dawce.

Zastosowanie:

wiosenna poprawka

Mustang Forte

Zalecenie:

0,8 l na 1 ha

stosować z promocją

D-Koder 5 zł do litra

PROMOCJA

www.d-koder.pl

D-KODER



Mustang Forte 195 SE to uniwersalny herbicyd opracowany specjalnie do powschodowego, wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Zaprojektowany po to, aby skutecznie zwalczać wszystkie uciążliwe chwasty mające znaczenie gospodarcze dzisiaj, jak również te, które mogą stanowić problem w przyszłości.

DAWKI I TERMINY ZABIEGU. UNIWERSALNOŚĆ

ZBOŻA OZIME – OCHRONA „POPRAWKOWA”

Po jesiennym zabiegu herbicydowym w zbożach ozimych, wiosną zazwyczaj nie ma potrzeby dokonania korekty zwalczającej miotłę zbożową, ponieważ większość preparatów skutecznie likwiduje tę niepożądaną roślinę. Przeprowadza się wtedy najczęściej zabiegi poprawkowe służące wyeliminowaniu pozostałych na polu chwastów dwuliściennych, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, chwasty rumianowate, mak polny czy samosiewy rzepaku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom integrowanej ochrony roślin, chcąc ułatwić Państwu wybór skutecznego i ekonomicznego preparatu, zalecamy w zabiegach poprawkowych użycie niższej dawki herbicydu **Mustang Forte 195 SE: 0,8 l/ha**.

Wyniki badań potwierdziły wysoką skuteczność preparatu **Mustang Forte 195 SE w dawce 0,8 l/ha** na: przytulię czepną, chaber bławatek, chwasty rumianowate, mak polny, samosiewy rzepaku, gwiazdnicę pospolitą, tasznik pospolity, tobołki polne.

Mustang Forte 195 SE w dawce 0,8 l/ha należy stosować wiosną jako zabieg poprawkowy po herbicydzie jesiennym.


Bez konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych.

ZBOŻA OZIME – OCHRONA PODSTAWOWA

Jeżeli jesienią nie użyto żadnego preparatu i cała ochrona zbóż ozimych przeciwko chwastom dwuliściennym ma miejsce wiosną, należy zastosować pełną dawkę preparatu **Mustang Forte 195 SE: 1 l/ha**.

Mustang Forte 195 SE w dawce 1 l/ha należy stosować wiosną jako zabieg podstawowy w przypadku braku jesiennego zabiegu herbicydowego.

Termin zabiegu bez kompromisu – od fazy początku krzewienia aż do fazy 2. kolanka zbóż ozimych.




ZBOŻA JARE



Optimalnie dopasowana dawka 0,8 l/ha niezależna od rodzaju i stanu zachwaszczenia.

Termin zabiegu: od fazy 4 liści aż do fazy 2. kolanka zbóż jarych.

TEMPERATURA. ELASTYCZNOŚĆ



Mustang Forte 195 SE zwalcza chwasty już od 5°C (taka minimalna temperatura średniodobowa powinna utrzymywać się przez 6 kolejnych dni po zabiegu).

MIESZANINY

Doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową i innymi środkami ochrony roślin stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelenia w źdźbło zbóż:

Pszenica ozima – środki chwastobójcze: chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa	MUSTANG FORTE 195 SE + NOMAD™ 75 WG 120 g/ha + DASSOIL™ 0,5 l/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Atlantis* 12 OD 0,45 l/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Attribut* 70 WG 60 g/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Apyros** 75 WG 13,3 g/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Protugan*** 500 SC (izoproturon) 2,5 l/ha
Pszenica ozima – środki zapobiegające wyleganiu zbóż	MUSTANG FORTE 195 SE + Antywylegacz Płynny*** 675 SL 2,0 l/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Moddus**** 250 EC 0,4 l/ha
Pszenica ozima – środki grzybobójcze	MUSTANG FORTE 195 SE + ATLAS™ 500 SC 0,2-0,3 l/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Input* 460 EC 1,0 l/ha
	MUSTANG FORTE 195 SE + Mirage*** 450 EC 1,0 l/ha
Pszenica ozima – nawozy dolistne	MUSTANG FORTE 195 SE + Siarczan Magnezu Jednowodny***** 2,5% stężenia cieczy roboczej

Uwaga! Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny.

CHWASTY

PRAKTYCZNY ATLAS



OBJAWY DZIAŁANIA NA CHWASTACH

Chwasty przestają rosnać kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (żółknięcia) widoczne najczęściej po 7-10 dniach, prowadzące do zamierania chwastów. W warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.

BEZPIECZEŃSTWO ROŚLIN

Podwójna dawka (przypadkowe nałożenie preparatu) Mustang Forte 195 SE zastosowana w optymalnych warunkach pogodowych do fazy 2. kolanka zbóż nie powoduje uszkodzeń i nie wpływała ujemnie na wysokość i jakość plonu w doświadczeniach rejestracyjnych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Mustang Forte 195 SE – wiele możliwości!

Po zastosowaniu herbicydu wiosną i po zbiorze plonu **MOŻESZ** zasiać/zasadzić:

- jesienią: **zboża, rzepak ozimy**, gorczycę na poplon, kapustę z rozsady, trawy
- wiosną: **zboża jare, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki**, sorgo, rzepak jary, gorczycę, słonecznik, cebulę z siewu, marchew, sałatę z rozsady, kapustę, kalafior, brokuł i inne rośliny kapustne, trawy

Słomę ze zbóż opryskanych produktem **MOŻESZ** użyć jako paszę oraz ściótkę dla zwierząt lub pozostawić na polu i przyorać.

Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być użyta do ściótkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), warzyw, np. pomidora, papryki, roślin dyniowatych, sałaty i innych.

Obornik ze zbóż opryskanych herbicydem **MOŻESZ** wywieźć tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych (należy go wywieźć i bezpośrednio po tym wymieszać z glebą).



Jeśli stosujesz obornik pod buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, słonecznik, pomidory, paprykę, ogórki i rośliny dyniowate, sałatę, tytoń, marchew, pietruszkę i inne warzywa, wywieź go i wymieszaj z glebą minimum 6 miesięcy przed ich uprawą.

W sprawie następstwa roślin dla innych upraw należy zapoznać się ze szczegółowym opisem na etykiecie-instrukcji stosowania lub skontaktować się z przedstawicielem Dow AgroSciences Polska.

WYBÓR. GOSPODARNOŚĆ

- efektywne i ekonomiczne rozwiązanie przy ochronie podstawowej oraz jako zabieg „poprawkowy”
- wyjątkowo szerokie spektrum i najwyższa skuteczność na chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych i jarych
- brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami na chwasty dwuliścienne
- bezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych
- opakowania dopasowane do różnej powierzchni zbóż w gospodarstwie
- doskonała mieszalność z innymi preparatami
- najbardziej uniwersalny produkt do ochrony zbóż ozimych i jarych!

Dowiedz się więcej na www.mustangforte.pl

