

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 96/2012 z dnia 20.07.2012 r.

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**

Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpia, Królestwo Belgii  
tel.: +32 3 568 51 23, fax: +32 3 568 50 90.

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej**

**Polskiej:** Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672  
Warszawa, tel: (22) 395 65 00, fax.: (22) 398 65 01, infolinia: (22) 395 65 09,  
www.monsanto.pl

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka  
dla ludzi i środowiska**

## **LATITUDE 125 FS**

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnej:

**siltiofam** (związek z grupy sililoamidów) - **125 g/l (11,8%)**

**Zezwolenie MRiRW Nr R- 96/2012 z dnia 20.07.2012 r.**

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

### **I OPIS DZIAŁANIA**

Środek grzybobójczy w postaci koncentratu zawiesinowego do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła, do stosowania łącznie z innymi zaprawami nasiennymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Zgorzel podstawy źdźbła jest chorobą pochodzenia glebowego, występującą w warunkach wysokiego udziału zbóż w płodozmianie. Zaprawianie ziarna ogranicza występowanie czernienia korzeni oraz pojawiania się przedwczesnego bielenia kłosów.

### **II ZASTOSOWANIE ŚRODKA**

#### **ROŚLINY ROLNICZE**

#### **Pszenica ozima**

zgorzel podstawy źdźbła.

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:** 200 ml/100 kg ziarna

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:** 200 ml/100 kg ziarna

Zaprawę Latitude 125 FS stosować łącznie z jedną z następujących zapraw:

- \* Baytan Universal 094 FS – 400ml/100 kg + 100 ml wody,
- \* Raxil Extra 515 FS – 200 ml/100 kg ziarna + 200 ml wody,
- \* Dividend 030 FS – 200 ml/100 kg ziarna + 200 ml wody.

#### **UWAGA**

Stosować się do zaleceń zawartych w etykietach zapraw używanych do mieszanin.

### **III SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA**

Latitude 125 FS stosować w mieszaninie z następującymi zaprawami:

Baytan Universal 094 FS, Raxil Extra 515 FS, Dividend 030 FS, przygotowując jeden roztwór.

Przed rozpoczęciem pracy dokładnie skalibrować urządzenie zaprawiające w celu zapewnienia równomierności pokrycia ziarna środkiem. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednie ilości zapraw dokładnie je mieszając.

Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Ścisłe przestrzegać właściwego dawkowania środka.

#### **UWAGI**

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawione ziarno winno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
4. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 %, skielkowanego lub powierzchniowo uszkodzonego.
5. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
7. **Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.**

### **IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

**1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.**

Nie dotyczy

**2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)**

Nie dotyczy

**3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)**

Nie dotyczy

#### **4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)**

Nie dotyczy

#### **5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO**

Nie dotyczy

#### **6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN**

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

#### **7. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Dla zaproponowanego zakresu stosowania zaprawy Latitude 125 FS wymagane jest następujące ograniczenie w stosowaniu:

- maksymalna dopuszczalna dawka środka wynosi 40 g substancji czynnej/ha (200 ml środka/100 kg materiału siewnego);
- maksymalna norma wysiewu dla powyżej dawki wynosi 160 kg ziarna/ha.

#### **V PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04  
 Kraków – (12) 411-99-99  
 Lublin – (81) 740-89-83  
 Łódź – (42) 657-99-00  
 Poznań – (61) 847-69-46

Rzeszów – (17) 866-40-25  
 Sosnowiec – (32) 266-11-45  
 Tarnów – (14) 631-54-09  
 Warszawa – (22) 619-66-54  
 Wrocław – (71) 343-30-08

**VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 0° C - 30° C.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....