

Safir[®] 125 SC

Bogactwo zalet!



 fungicyd – epoksykonazol

ADAMA

Warunki środowiska, a szczególnie mokre lata, mogą sprzyjać rozwojowi septoriozy liści zbóż. Choroba ta jest bardzo groźna ze względu na straty, jakie może powodować w plonie – nawet do 25%!



**Septorioza
liści
- do 25%
strat
w plonie**

Safir 125 SC:




- zawiera najbardziej aktywny triazol (epoksykonazol) w historii ochrony zbóż ozimych i jarych,
- skutecznie działa na kluczowe choroby grzybowe zbóż w fazie liścia flagowego (T2) (septorioza liści, mączniak prawdziwy, rdze),
- potrójne działanie: zapobiegawcze, interwencyjne oraz wyniszczające,
- niezastąpiony w zwalczaniu chwościka buraka,
- skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą,
- doskonały partner do mieszanin zbiornikowych.

Safir 125 SC – kompleksowy sposób walki z chorobami grzybowymi

Safir 125 SC może być stosowany na każdym etapie rozwoju choroby:

- 1 przed pojawieniem się objawów na roślinie (działanie zapobiegawcze),
- 2 krótko po rozpoczęciu infekcji (działanie interwencyjne),
- 3 w dalszych etapach rozwoju choroby w celu niszczenia grzybn i zarodników, co zapobiega wtórnym infekcjom i dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby (działanie wyniszczające).

Safir 125 SC jest fungicydem o działaniu systemicznym – wnika do tkanek rośliny i jest w nich rozprzestrzeniany. Po aplikacji na liście jest bardzo szybko wchłaniany oraz transportowany w górę rośliny, przez co zapewnia nieprzerwaną i długą ochronę.



Safir 125 SC – niezawodny fungicyd w ochronie zbóż ozimych i jarych

Safir 125 SC
– ochrona przed
najgroźniejszymi
chorobami zbóż




mączniak prawdziwy



septorioza liści



septorioza plew



rdza jęczmienia



rychnosporioza



plamistość siatkowa



rdza brunatna

Safir 125 SC – udowodniona skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób grzybowych w uprawach zbóż

Zakres chorób zwalczanych przez Safir 125 SC w zbożach ozimych i jarych

	mączniak prawdziwy	septorioza liści	rdza brunatna	septorioza plew	rychnosporioza	rdza jęczmienia	plamistość siatkowa
pszenica ozima	●	●	●	●			
pszenica jara	●	●	●	●			
żyto	●		●		●		
pszenżyto ozime	●	●	●	●			
jęczmień jary						●	●

Safir 125 SC – skuteczne działanie w fazie liścia flagowego (T2)

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime.


Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia; zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Żyto, jęczmień jary.

Termin stosowania: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia; zabiegi wykonać z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Zalecana dawka: 1 l/ha.



Safir 125 SC – idealny do mieszanki zbiornikowej z Phoenix[®] 500 SC – nowość w ochronie zbóż w fazie liścia flagowego


Phoenix 500 SC zawiera folpet – nową substancję biologicznie czynną z grupy chemicznej ftalimidów, dotąd nie stosowaną w ochronie pszenicy oraz jęczmienia.

Pszenica ozima.

- mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew.
Termin stosowania: zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

Zalecana dawka:

Safir 125 SC 0,75 l/ha + Phoenix 500 SC 1,5 l/ha.



Safir 125 SC skutecznie zwalcza najgroźniejsze choroby grzybowe buraka cukrowego




chwościk buraka

Safir 125 SC w buraku cukrowym może być stosowany po pojawieniu się pierwszych objawów chorób.

Safir 125 SC – skuteczność w zwalczaniu chwościka buraka.

Średnia skuteczność epoksykonazolu na podstawie doświadczeń wykonanych w Polsce. Zabieg wykonany po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.



Burak cukrowy.


Zakres stosowania: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, mączniak prawdziwy buraka.

Termin stosowania: od końca fazy zakrywania międzyrzędzi, po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Safir 125 SC 1 l/ha





ZESKANUJ KOD



Zadzwoń do doradcy!

REGION 1

Paweł Szrajner, tel. 504 242 453
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 1 Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
- 2 Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
- 3 Mariola Redzimska, tel. 695 290 205

REGION 2

Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 4 Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
- 5 Diana Podoba, tel. 504 242 576
- 6 Aleksandra Sowińska, tel. 695 290 966

REGION 3

Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 7 Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
- 8 Mikołaj Ciesielski, tel. 798 685 185
- 9 Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

REGION 4

Daniel Piech, tel. 504 242 573
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 10 Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
- 11 Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

REGION 5

Waldemar Mendel, tel. 504 242 509
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 12 Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
- 13 Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
- 14 Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.