



---

# Elvita Bor

---

**PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY**  
**Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy PFC 1(C)(II)(a)**

A large, olive-green diamond shape is centered in the lower half of the page. It is formed by four intersecting lines that create a grid of diamond shapes. The number '10 I' is printed in a large, white, bold, sans-serif font inside the central diamond. Below the central diamond are two more olive-green diamonds, one on the left and one on the right, which are partially cut off by the bottom edge of the page.

10 I

# Elvita Bor

**PROSTY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY**  
**Nieorganiczny nawóz mikroelementowy PFC 1(C)(II)(a)**

Typologia: Nawóz mikroelementowy w postaci roztworu

**SKŁAD (% w/w):**

bor (B) w postaci boroetanoaminy, rozpuszczalnego w wodzie	11%
--	-----

**SKŁADNIKI:**

boretanoamina<sup>1</sup> (CAS 26038-87-9)

<sup>1</sup> *Pierwotne surowce i mieszanki*

Uprawa	Termin zabiegu	Dawka [l/ha]	Ilość cieczy roboczej [l/ha]
jabłoni, grusza	W fazie różowego pąka i w trakcie opadania płatków kwiatowych. Po zbiorach, ale przed żółknięciem liści	0,8-1,5	500-800
wiśnia, czereśnia, śliwa	W fazie białego pąka. Po zbiorach owoców przed rozpoczęciem żółknięcia liści	0,8-1,5	500-800
truskawki, maliny	Pierwszy zabieg w fazie białego pąka, drugi po 10-14 dniach	0,5-1,0	500-800
porzeczki, agrest	Po wytworzeniu pąków kwiatowych i pod koniec kwitnienia Przy silnym braku – po zbiorze, a przed opadnięciem liści	0,8-1,5 0,8-1,5	500-800 500-800
winogrono	Przed kwitnieniem i po kwitnieniu w momencie pojawienia się związków	0,8-1,5	500-800
warzywa kapustne	1-3 zabiegi, 2 tygodnie po wsadzeniu rozsady, następnie co 10-14 dni	0,8-1,5	400-600
pozostałe warzywa	1-3 zabiegi, na dobrze rozwinięte liście co 10-14 dni	0,8-1,5	400-600
rzepak	Jesienią: po wytworzeniu 6-8 liści Wiosną: po ruszeniu wegetacji, 10-14 dni później, po wytworzeniu pąków kwiatowych	0,6-1,0 0,6-1,0	200-300 200-300
buraki cukrowe	W fazie 6-8 liści oraz 10-14 dni później	0,6-1,0	200-300
ziemniaki	Przed zwraciem międzyrzędzi	0,4-0,8	200-300
rośliny motylkowe	W fazie 6-8 liści przed kwitnieniem	0,6-1,0	200-300
drzewa i krzewy ozdobne	W trakcie wegetacji z pominięciem okresu kwitnienia oraz przy silnych niedoborach	0,8-1,5	200-500
kwiaty	Przed kwitnieniem lub przy niedoborach	0,5-0,8	400-600

**INSTRUKCJA UŻYCIA:**

- napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wlewać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień pobierał go na bieżąco.

Opryski należy wykonywać w godzinach wieczornych albo w czasie pochmurnej pogody.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA:** -10°C ÷ 30°C

**INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA:** nie dotyczy

**INFORMACJE DODATKOWE:** Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

W pracach z nawozem używać rękawic ochronnych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zanieczyszczoną skórę lub oczy wypłukać bieżącą wodą. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W przypadku rozlania zebrać z materiałem pochłaniającym cieczę, następnie zanieczyszczone miejsce zmyć wodą. Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.



Data produkcji/nr serii