

Doskonały splot zalet

Plonowanie 🌾 Zdrowotność 🌾 Jakość

Pszenica ozima
Delawar



 **Delawar**

syngenta®

- pszenica ozima – Delawar – odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
- doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
- rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie



Delawar

Pszenica jakościowa (A)




DOSKONAŁA KOMBINACJA PLONOWANIA, JAKOŚCI I ZDROWOTNOŚCI

Delawar – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A) zarejestrowana w Polsce w roku 2015. Odmiana o dużym potencjale plonowania, wykazuje wyjątkową odporność na wszystkie choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie.

PSZENICA OZIMA – DELAWAR (A)

- ✓ odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
- ✓ rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
- ✓ doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY




Wzorzec COBORU 2012–2015: Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka, RGT Kilimanjaro



Delaware

Pszenica jakościowa (A)

PLONOWANIE W RÓŻNYCH REJONACH POLSKI (COBORU, ZBIÓR 2013, 2014, 2015)



Plonowanie odmiany Delaware w różnych rejonach Polski

A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

PROFIL ODMIANY

Plon (zbiór 2013, 2014, 2015)

poziom A1 105% wzorca

poziom A2 102% wzorca

Cechy agrotechniczne

termin kłoszenia średniopóźny

termin dojrzewania średni

wysokość roślin dość niska (89 cm)

zimotrwałość średnia (4)

odporność na wyleganie duża (8,3)

masa 1000 ziaren mała do średniej (41,5 g)

Parametry jakościowe ziarna

liczba opadania wysoka

zawartość białka średnia do wysokiej

wydajność mąki wysoka

Źródło: doświadczenia rejestracyjne COBORU

poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

syngenta

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

- ✓ wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m²
- ✓ optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m²
- ✓ opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m²

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

- ✓ krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
- ✓ strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
- ✓ początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha

PROGRAM OCHRONY

ochrona przed chorobami



regulator wzrostu



wiosenna ochrona przed chwastami



ochrona przed szkodnikami



jesienna ochrona przed chwastami



zaprawa zbożowa

