



LOKSAN EC

Producent: Elvita Sp. z o.o., Różewo, 78-627 Różewo,
tel. 67 260 07 02; e-mail: kontakt@elvita.com.pl

OPIS DZIAŁANIA

Loksan EC jest preparatem silikonowym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczonym do interwencyjnego zwalczania owadów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych, ozdobnych, sadowniczych i warzywnych. Działa poprzez fizyczne zwalczanie organizmów szkodliwych, stąd możliwość corocznego stosowania bez obawy o uodpornienia owadów na preparat. Ponadto w mieszaniu zbiornikowej z środkami ochrony roślin zwiększa ich wydajność biologiczną dzięki lepszemu zwilżaniu i pokryciu powierzchni roślin oraz przenikaniu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych, polowych i ręcznych.
Nie wymaga stosowania adiuwantów.

STOSOWANIE PREPARATU ŁĄCZNIE ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Zalecane stężenie: 0,05 % - 0,1 % (50 – 100 ml preparatu w 100 l cieczy użytkowej środka ochrony roślin).

Rekomendowane przy wysokim nasileniu występowania szkodników. Przed wykonaniem zabiegu mieszanie środka ochrony rośliny z preparatem Loksan EC, należy sprawdzić na zgodność fizyczną sporządzonej mieszanki oraz wykonać próbny zabieg na kilku roślinach, czy nie występują objawy fitotoksyczności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek Loksan EC stosować przemienne ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.
2. Opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
4. Preparatu nie stosować na rośliny młode, uszkodzone, w trakcie kwitnienia roślin a także w trakcie wybarwiania się owoców.
5. Preparatu nie stosować w uprawie pomidora.
6. Nie stosować na roślinach o niebieskim zabarwieniu, gdyż może powodować utratę lub spadek intensywności niebieskiej barwy.
7. Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 20°C, a w czasie upałów i silnego nasłonecznienia zabieg należy wykonać wcześniej rano lub wieczorem.
8. Nie stosować przed spodziewanym deszczem (5-6 godz.)
9. W uprawie warzyw należy zachować co najmniej 7-dniowy odstęp czasu pomiędzy zabiegiem preparatem a stosowaniem herbicydów.
10. Ze względu na fizyczny charakter działania nie powoduje powstawania zjawiska odporności szkodników i w związku z tym może być stosowany wielokrotnie w sezonie, bez obawy obniżenia skuteczności.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłono, grusza, wiśnia
Mszyce, przędziorki, larwy mszeczników
Zalecane stężenie: 0,1 – 0,2% (100-200 ml na 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji).
Odstęp między zabiegami: 5 - 7 dni
Dodatkowo należy zachować 7 dniową przerwę w zabiegach przed lub po nawożeniu wapniowym.

ROŚLINY WARZYWNE

Ogórek, kapusta wczesna, kapusta późna
Mszyce, przędziorki
Zalecane stężenie: 0,1 - 0,2% (100-200 ml na 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji)
Odstęp między zabiegami: 5 - 7 dni

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ:

Nie dotyczy

OKRES KARENCJI:

Nie dotyczy

PIERWSZA POMOC:

Brak antidotum. Stosować leczenie objawowe.

ROŚLINY OZDOBNE

Chryzantema, róża
Mszyce, przędziorki, larwy mszeczników
Zalecane stężenie: 0,1 - 0,2% (100-200 ml na 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-2000 l/ha (w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin na plantacji)
Odstęp między zabiegami: 5 - 7 dni

ROŚLINY ROLNICZE

Zboża ozime i jare
Mszyce
Zalecane stężenie: 0,1 – 0,15% (100-150 ml na 100 l wody)
Termin stosowania: Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha
Odstęp między zabiegami: 5 - 7 dni

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

W przypadku łącznego stosowania preparatu ze środkami ochrony roślin należy najpierw przygotować ciecz użytkową środka ochrony, a następnie dodawać Loksan EC.



H319 – Działa drażniąco na oczy.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Środek przechowywać w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 5°C-30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zawartość Netto

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji i nr partii **na opakowaniu**

